

● CHROMagar™ Pasteurella



Click below:



● CHROMagar™ Pasteurella



For detection of Pasteurellaceae






Plate Reading



- Pasteurellaceae
→ Pink to mauve



- *E. coli*, coliforms
→ inhibited or blue to steel blue



For detection of Pasteurellaceae

Background

In the veterinary field, respiratory infections in cattle herds can cause stunted growth, decline in milk production and death of animals, leading to significant economic losses.

Bacteria of the Pasteurellaceae family are commensal to the upper respiratory tract of many vertebrate species. Among them, *Histophilus somni*, *Pasteurella multocida* and *Mannheimia haemolytica* are among the main bacteria associated with the pathogene complex of bovine respiratory diseases. During infection, these species cause complications which can lead to sepsis and death of the animal.

CHROMagar™ Pasteurella was therefore developed to improve the detection of Pasteurellaceae from a bovine respiratory sample (eg. nasal swab, trans-tracheal aspiration (TTA) and lung). This chromogenic medium to aid in qualitative diagnosis allows the detection and isolation of Pasteurellaceae colonies by inhibition or differentiation of the annex flora.

CHROMagar™ Pasteurella medium can also be used for samples from the respiratory tract of mammals such as cats and dogs.

Medium Performance

- 1 UNIQUE CHROMOGENIC MEDIA**
First and only available specific medium for Pasteurellaceae in the market.
- 2 LOWER WORKLOAD**
Contrary to general media like blood agar, CHROMagar™ Pasteurella differentiates the target group from the other bacteria by a distinctive mauve colony color.
- 3 HIGHLY SELECTIVE**
Most of the environmental flora will be inhibited.
- 4 EARLY PLATE READING**
Most isolates will have a noticeable colony size after just overnight incubation.

Medium Description

Powder Base	Total	41.2 g/L
	Agar	15.0
	Salt	5.0
	Peptones	21.0
	Chromogenic and selective mix	0.2
	Storage at 15/30 °C - pH: 7.0 ± 0.2.	
	Shelf Life	> 18 months
Supplement S1 (Included in the pack)	Liquid form	8 mL/L
	Storage at 15/30 °C Shelf Life	> 18 months
Supplement S2 (Included in the pack)	Powder form	1 g/L
	Storage at 2/8 °C Shelf Life	> 18 months
Usual Samples	nasal swab, trans-tracheal aspiration (TTA), bronchial lavages, lung.	
Procedure	Isolation & spreading method. Incubation 18- 24 h, 37 °C. Aerobic conditions.	

Order References

Please use these product references when contacting your local distributor:


5000 mL pack PR012 (included in this reference: powder base PR012(B)
+ suppl. PR012(S1) + suppl. PR012(S2))

Manufacturer: CHROMagar
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France
Email: CHROMagar@CHROMagar.com
Website: www.CHROMagar.com
Find your nearest distributor on
www.CHROMagar.com/contact

● CHROMagar™ Pasteurella



Pour la détection de Pasteurellaceae





Lecture



• Pasteurellaceae
→ Rose à mauve



• *E. coli*, coliformes
→ inhibé ou bleu à
bleu métallique



Pour la détection de Pasteurellaceae

Contexte

Dans le domaine vétérinaire, les infections respiratoires chez les troupeaux bovins peuvent causer des retards de croissance, des baisses de production laitière ainsi que la mort d'animaux, entraînant des pertes économiques importantes. Les bactéries de la famille Pasteurellaceae sont commensales du tractus respiratoire des voies supérieures de nombreuses espèces vertébrés.

Parmi elles, *Histophilus somni*, *Pasteurella multocida* et *Mannheimia haemolytica* font partie des principales bactéries associées au complexe pathogène des maladies respiratoires bovines. Lors d'une infection, ces espèces entraînent des complications pouvant aller jusqu'à la septicémie et la mort de l'animal.

CHROMagar™ Pasteurella a donc été développé pour améliorer la détection de Pasteurellaceae à partir d'un échantillon respiratoire bovin (ex. écouvillon nasal, aspiration trans-trachéale (ATT) et poumon). Ce milieu chromogène d'aide au diagnostic qualitatif permet la détection et l'isolement de colonies de Pasteurellaceae par inhibition ou différenciation de la flore annexe.

Le milieu CHROMagar™ Pasteurella peut également être utilisé pour des prélèvements de tractus respiratoire de mammifères tels que le chat et le chien.

Performance du milieu

- 1 **PREMIER MILIEU CHROMOGÈNE**
Premier et unique milieu spécifique disponible sur le marché pour la détection des Pasteurellaceae.
- 2 **CHARGE DE TRAVAIL MOINS IMPORTANTE**
Contrairement aux milieux traditionnels comme la gélose au sang, CHROMagar™ Pasteurella différencie par la couleur mauve, le groupe cible des autres bactéries.
- 3 **TRÈS SÉLECTIF**
La plupart de la flore environnementale est inhibée.
- 4 **LECTURE RAPIDE**
La plupart des isolats auront une taille de colonie notable après seulement une nuit d'incubation.

Description du milieu

Base	Total	41,2 g/L
	Agar	15,0
	Sels	5,0
	Peptones	21,0
	Mix chromogène et sélectif	0,2
	Stockage à 15/30 °C - pH: 7,0 ± 0,2.	
Supplément S1 (Inclus dans le pack)	Durée de conservation	> 18 mois
	Liquide	8 mL/L
Supplément S2 (Inclus dans le pack)	Stockage à 15/30 °C Conservation	> 18 mois
	Poudre	1 g/L
Supplément S2 (Inclus dans le pack)	Stockage à 2/8 °C Conservation	> 18 mois

Échantillons habituels	Écouvillons nasaux, aspiration transtrachéale (ATT), lavage broncho-alvéolaire (LBA), poumon.
Procédure	Technique d'isolement & d'rétalement. Incubation de 18 à 24 h, à 37 °C en aérobic.
Publications scientifiques sur ce produit : disponible sur www.CHROMagar.com Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation (notices) disponibles sur www.CHROMagar.com	

Références pour commander

Veuillez utiliser ces références produits lorsque vous contactez votre distributeur local :


Pack de 5000 mL PR012 (inclus dans cette référence: base poudre PR012(B)
+ suppl. PR012(S1) + suppl. PR012(S2))

Fabricant : CHROMagar
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France
Email : CHROMagar@CHROMagar.com
Site web : www.CHROMagar.com
Trouvez votre distributeur le plus proche sur
www.CHROMagar.com/contact

● CHROMagar™ Pasteurella



Para la detección de Pasteurellaceae



Lectura de placa

• Pasteurellaceae
→ Rosa a malva

• *E. coli*, coliformes
→ inhibido o azul a azul acero

Para la detección de Pasteurellaceae

Antecedentes

En el campo veterinario, las infecciones respiratorias en los rebaños de ganado pueden causar retraso en el crecimiento, disminución de la producción de leche y muerte de los animales, lo que conlleva importantes pérdidas económicas.

Las bacterias de la familia Pasteurellaceae son comensales del tracto respiratorio superior de muchas especies de vertebrados. Entre ellas, *Histophilus somni*, *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*, forman parte de las principales bacterias asociadas al complejo patógeno de las enfermedades respiratorias bovinas. Durante la infección, estas especies causan complicaciones que pueden provocar sepsis y la muerte del animal.

En este contexto, CHROMagar™ Pasteurella se desarrolló para mejorar la detección de Pasteurellaceae a partir de una muestra respiratoria bovina (por ejemplo, frotis nasal, aspiración transtraqueal (ATT) y pulmón). Este medio cromogénico para ayudar en el diagnóstico cualitativo, permite la detección y el aislamiento de colonias de Pasteurellaceae por inhibición o diferenciación de la flora anexa.

El medio CHROMagar™ Pasteurella también se puede utilizar para muestras del tracto respiratorio de mamíferos como gatos y perros.

Rendimiento del medio

- 1 **MEDIO CROMOGÉNICO ÚNICO**
Primer y único medio específico para Pasteurellaceae disponible en el mercado.
- 2 **MENOR CARGA DE TRABAJO**
A diferencia de los medios tradicionales como el agar sangre, CHROMagar™ Pasteurella diferencia por el distintivo color malva, el grupo objetivo de las otras bacterias.
- 3 **ALTAMENTE SELECTIVO**
Se inhibirá la mayor parte de la flora ambiental.
- 4 **LECTURA ANTICIPADA DE PLACA**
La mayoría de los aislamientos tendrá un tamaño de colonia notable después de una incubación durante la noche.

Descripción del medio

Base en polvo	Total41,2 g/L Agar 15,0 Sal 5,0 Peptonas 21,0 Mezcla cromogénica y selectiva 0,2 Almacenamiento a 15/30 °C - pH: 7,0 ± 0,2. Vida útil > 18 meses
Suplemento S1 (Incluido en el kit)	En líquido 8 mL/L Almacenamiento a 15/30 °C Vida útil > 18 meses
Suplemento S2 (Incluido en el kit)	En polvo 1 g/L Almacenamiento a 2/8 °C Vida útil > 18 meses

Muestras habituales	Hisopos nasales, aspiración transtraqueal (ATT), lavado bronco-alveolar (LBA), pulmón.
Procedimiento	Siembra directa, en estrías. Incubación 18-24 h. 37 °C Condiciones aeróbicas.
Publicaciones científicas sobre este producto disponibles en www.CHROMagar.com Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de uso (documento IFU) disponibles en www.CHROMagar.com	

Información para hacer pedidos

Gracias por utilizar las siguientes referencias al consultar a su distribuidor :

Envase de 5000 mL PR012 (incluido en esta referencia: base en polvo PR012(B)
+ supl. PR012(S1) + supl. PR012(S2))

Fabricante: CHROMagar
4 place du 18 juin 1940 75006 Paris - France
Email: CHROMagar@CHROMagar.com
Sitio web: www.CHROMagar.com
Encuentre su distribuidor más cercano en:
www.CHROMagar.com/contact